

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato:
Kontor: Lægemiddelkontoret
J.nr.: 2006-11033-53
Sagsbeh.: TBA
Fil-navn: Dokument 2

Besvarelse af spørgsmål nr. 10 (B 41), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 6. marts 2006

Spørgsmål 10:

"Kan ministeren oplyse, hvad status er for antallet af gigtpatienter i biologisk behandling, herunder de geografiske forskelle?"

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse i Lægemiddelstyrelsen, hvortil jeg kan henholde mig:

"Der anvendes fire biologiske lægemidler i behandlingen af leddegigt.

- Enbrel® (ATC-kode L04AA11)
- Remicade® (ATC-kode L04AA12)
- Kineret® (ATC-kode L04AA14)
- Humira® (ATC-kode L04AA17)

Det er ikke muligt at tage højde for de tilfælde, hvor lægemidlerne kan være anvendt til andre indikationer end leddegigt. Det vides, at især Remicade® anvendes til andre indikationer end leddegigt.

Behandling med de fire lægemidler foregår oftest på sygehusene. Her bliver cpr-nummeret ikke registreret i forbindelse med registreringen af lægemiddelforbruget. Derfor er det ikke muligt at oplyse det samlede antal personer i behandling.

Der vises i stedet en opgørelse af det samlede forbrug af døgndoser (DDD) på landsplan (Tabel 1) og en beregning af forbruget per 1000 indbyggere i henholdsvis Øst- og Vestdanmark (Figur 1).


I Tabel 1 ses det samlede forbrug i Danmark. Forbruget er stigende, f.eks. er forbruget steget med 46 pct. fra 2004 til 2005.

Tabel 1. Det samlede mængdeforbrug (DDD) af biologiske lægemidler til behandling af leddegigt i Danmark.

	2001	2002	2003	2004	2005
Enbrel®	.	.	39.829	182.589	293.617
Remicade®	163.709	261.977	362.378	461.259	610.568
Kineret®	.	7.098	10.605	5.446	6.384
Humira®	.	.	15.007	136.302	234.978
I alt	163.709	269.075	427.819	785.596	1.145.547

I Figur 1 sammenlignes forbruget per indbygger i Østdanmark med forbruget i Vestdanmark. Fyns amt indgår her i Vestdanmark. Forbruget i Østdanmark er størst, og f.eks. ses det, at i 2004 og 2005 var forbruget 28-29 pct. mindre i Vestdanmark end i Østdanmark.

Figur 1. Det samlede forbrug af Enbrel®, Remicade®, Kineret® og Humira® i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Fyns Amt indgår her i Vestdanmark.



I de to opgørelser indgår det samlede forbrug på sygehusene samt de få gange, lægemidlerne blev ordineret i almen lægepraksis.

I de geografiske data er det ikke muligt at tage højde for det frie sygehusvalg, og det er ikke muligt at tage højde for eventuelle geografiske forskelle på anvendelsen af lægemidlerne til andre indikationer end leddegigt.”