

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Dato: 27. august 2007
Kontor: Lægemiddelkontoret
J.nr.: 2007-13009-522
Sagsbeh.: nmo
Fil-navn: Dokument 2

Besvarelse af spørgsmål nr. 2 (ad B 141), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 14. juni 2007

Spørgsmål 1:

"Vil ministeren tilsende udvalget en gennemgang af udviklingen i antallet af forgiftninger herhjemme, hvor udgangspunktet har været et ønske om at begå selvmord. I besvarelsen af spørgsmålet bedes inddraget statistik fra Center for Selvmordsforskning."

Svar:

Jeg har i anledning af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen har indhentet opdaterede tal fra Sundhedsstyrelsen, baseret på data fra Landspatientregisteret over antallet af forgiftninger og selvmordsforsøg med svage smertestillende lægemidler, der har ført til indlæggelse på somatisk sygehus.

Tabel 1 viser antallet af forgiftninger med svage smertestillende lægemidler, som har ført til indlæggelse på et somatisk sygehus i perioden 1997 til 2006. Forgiftningerne inkluderer selvmordsforsøg, der er opgjort selvstændigt i tabel 2.

Tabel 1. Indlæggelser ved somatiske sygehuse med forgiftninger forårsaget af lægemidler med acetylsalicylsyre eller paracetamol.

	Alder	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Mænd	0-11 år	17	14	12	14	16	17	20	26	30	38
	12-20 år	38	53	61	57	63	65	100	91	109	86
	21-50 år	231	262	204	282	373	323	318	350	357	343
	51- år	33	53	64	60	67	85	99	106	126	104
	I alt	319	382	341	413	519	490	537	573	622	571
Kvinder	0-11 år	6	11	9	16	19	21	23	16	31	43
	12-20 år	221	303	322	372	448	524	589	635	742	701
	21-50 år	358	439	468	485	619	615	655	797	835	861
	51- år	107	131	120	140	180	174	178	165	205	180
	I alt	692	884	919	1013	1266	1334	1445	1613	1813	1785

Kilde: Landspatientregisteret 14. august 2007.

Det fremgår af tabel 2, at antallet af selvmordsforsøg med svage smertestillende lægemidler blandt unge piger (12-20 år) har været stigende i perioden fra 1997 til 2002 men nogenlunde konstant fra 2002 til 2006. Sundhedsstyrelsen oplyser, at tallene i tabel 1 og 2 er forbundet med nogen usikkerhed, og at registreringen af selvmordsforsøg i Landspatientregisteret er mangelfuld. Det reelle antal selvmordsforsøg er derfor usikkert.

Tabel 2. Indlæggelser ved somatiske sygehuse, selvmordsforsøg med lægemidler med acetylsalicylsyre eller paracetamol.

	Alder	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Mænd	0-11 år	2	2	1	0	1	0	0	2	0	0
	12-20 år	16	23	23	16	29	28	33	34	31	32
	21-50 år	108	122	87	117	158	122	105	127	150	123
	51- år	11	18	16	13	25	32	34	31	36	35
	I alt	137	165	127	146	213	182	172	194	217	190
Kvinder	0-11 år	2	2	0	0	1	0	1	2	0	1
	12-20 år	114	153	150	172	187	237	242	235	292	239
	21-50 år	186	199	213	181	234	214	244	291	282	282
	51- år	43	50	39	46	59	50	62	58	69	52
	I alt	345	404	402	399	481	501	549	586	643	574

Kilde: Landspatientregisteret 14. august 2007.

Lægemiddelstyrelsen har endvidere anmodet Center for Selvmordsforskning om relevant statistik.

Center for Selvmordsforskning har i juli 2007 fremsendt statistisk materiale, der bygger på data fra Register for Selvmordsforsøg. Dette register indeholder data om selvmordsforsøg i (det tidligere) Fyns Amt med kontakt til et sygehus enten i form af en indlæggelse eller et skadestuebesøg på en somatisk eller psykiatrisk afdeling. Registeret indeholder oplysninger om ca. 10.000 selvmordsforsøg, der er foretaget af ca. 6.000 personer.

Det fremgår af Register for Selvmordsforsøg, at antallet af selvmordsforsøg med forgiftning som hovedmetode blandt 15-19-årige kvinder har været stigende i perioden 1990 til 2004, jf. tabel 3. I modsætning hertil har antallet af selvmordsforsøg med forgiftning som hovedmetode været stort set konstant blandt 20-29-årige kvinder og 15-29-årige mænd.

Tabel 3. Selvmordsforsøg med forgiftning som hovedmetode (Fyns Amt)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mænd															
15-19 år	17	8	10	14	6	9	3	6	11	6	9	11	8	11	14
Mænd															
20-29 år	67	63	67	60	65	32	38	32	31	30	38	37	38	37	37
Kvinder															
15-19 år	17	28	25	27	44	35	29	37	47	31	46	39	51	52	73
Kvinder															
20-29 år	70	50	54	85	64	54	47	56	63	59	59	72	65	87	64

Kilde: Center for Selvmordsforskning, Register for Selvmordsforsøg

Ved langt de fleste selvmordsforsøg, der udføres ved forgiftning, indgår lægemidler. Tabel 4 viser da også, at udviklingen i antallet af selvmordsforsøg, hvori medicinforgiftning indgår (altså ikke nødvendigvis som hovedmetode), svarer til den ovenfor viste udvikling i antallet af selvmordsforsøg med forgiftning som hovedmetode.

Tabel 4. Antal selvmordsforsøg, hvori der indgår medicinforgiftning (Fyns Amt)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mænd															
15-19 år	15	6	9	14	7	9	4	6	12	6	9	11	9	10	13
Mænd															
20-29 år	61	62	67	59	65	31	38	30	30	31	37	39	33	36	36
Kvinder															
15-19 år	17	26	25	27	45	38	27	38	47	31	47	41	53	54	79
Kvinder															
20-29 år	73	53	54	86	66	54	47	58	63	60	63	74	66	87	67

Kilde: Center for Selvmordsforskning, Register for Selvmordsforsøg

Når tallene for selvmordsforsøg, hvori der indgår medicinforgiftning, nedbrydes på lægemiddelgrupper, ses det dels, at den gruppe, hvori de svage smertestillende lægemidler indgår, er relativt stor, ikke mindst blandt 15-19-årige kvinder, dels at udviklingen svarer til den ovenfor nævnte generelle udvikling, dvs. en stigende tendens blandt de helt unge kvinder, mens antallet ligger nogenlunde konstant for de øvrige unge, jf. tabel 5.

Tabel 5. Antal selvmordsforsøg, hvori der indgår non-opioide analgetika, antipyretika og antirheumatika, herunder svage smertestillende lægemidler (Fyns Amt)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Mænd															
15-19 år	6	2	4	6	5	2	2	4	9	4	4	9	4	7	10
Mænd															
20-29 år	17	15	16	15	20	10	8	14	12	12	15	24	14	17	18
Kvinder															
15-19 år	10	14	9	17	28	30	23	28	39	26	37	29	40	47	67
Kvinder															
20-29 år	28	18	14	28	28	22	21	34	27	37	32	44	36	42	39

Kilde: Center for Selvmordsforskning, Register for Selvmordsforsøg

Jeg henholder mig til ovenstående oplysninger.