



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Dato: 23. maj 2014
Enhed: Primær Sundhed
Sagsbeh.: DEPSBRE
Sags nr.: 1402693
Dok nr.: 1460573

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 30. april 2014 stillet følgende spørgsmål nr. 1 (i forlængelse af B 68) til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet på vegne af udvalget.

Spørgsmål nr. 1:

”Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 25. april 2014 fra Psykiatrisk Center København og Københavns Universitet, jf. B 68 - bilag 1”.

Svar:

Nærværende henvendelses indhold er sammenligneligt med indholdet af foreliggende beslutningsforslag, hvorfor jeg bedt Sundhedsstyrelsen om alene at forholde sig fagligt til emner, der ikke fremgår af beslutningsforslaget. Sundhedsstyrelsen udtaler således følgende, som jeg henholder mig til:

”Sundhedsstyrelsen har bedt Statens Institut for Folkesundhed (SIF) om at udforme en samlet tabel over forekomst af selvmordsforsøg de seneste ti år hos piger og kvinder i alderen 15-24 år, da Sundhedsstyrelsen ikke tidligere har udformet en sådan tabel.

Ifølge SIF viser en analyse af registreringspraksis i perioden 2004-2013, at for den samme type hændelse (medicinforgiftning blandt unge kvinder, som er den hyppigste form for selvmordsforsøg blandt disse) er der en betydelig variation i, om en sådan hændelse registreres som selvmordsforsøg på sygehuset. Der er, som tidligere nævnt, en variation mellem sygehuse (fra 1 % til 66 %, i gennemsnit 29 %), og fra år til år (fra 25 % til 33 %, i gennemsnit 29 %). En opgørelse på baggrund af den registrerede kontaktårsag er derfor meget usikker.

Hvis udviklingen skal følges, er det derfor en bedre metode at se på antallet af medicinforgiftninger uanset om de er kodet som selvmordsforsøg eller ej, da disse antages at blive mere ensartet registreret. Medicinforgiftning udgør størstedelen af selvmordsforsøgene for kvinder mellem 15-24 år. Derfor indgår både selvmordsforsøg og medicinforgiftning i tabellen herunder.

Tabel 1: Udvikling i registrering af selvmordsforsøg blandt kvinder i alderen 15-24 år

År	Antal		Rate pr. 1.000	
	Sygehusforløb registreret med kontaktårsag "selvmordsforsøg"	Sygehusforløb med medicinforgiftning	Sygehusforløb registreret med kontakt-årsag "selvmordsforsøg"	Sygehusforløb med medicinforgiftning
2004	942	1.510	3,2	5,2
2005	1.003	1.712	3,4	5,8
2006	1.042	1.801	3,5	6,1
2007	1.122	1.943	3,7	6,4
2008	1.072	1.989	3,4	6,4
2009	1.108	2.187	3,4	6,8
2010	1.180	2.125	3,6	6,4
2011	1.184	2.094	3,5	6,2
2012	1.077	1.909	3,1	5,5
2013	961*	1.733*	2,7*	4,9*

Kilde: Landspatientregisteret, Statens Seruminstitut. Alle sygehuskontakter (indlæggelser, ambulante forløb og skadestuebesøg) indenfor en uge er talt som et forløb for at undgå dobbeltregistrering ved indlæggelse eller overflytning til et andet sygehus.

*) tallet for 2013 kan være lidt for lavt, da enkelte sygehuse endnu ikke har indberettet alle oplysninger.

Det skal bemærkes, at nogle kvinder har flere selvmordsforsøg, så antallet af kvinder er noget mindre end antallet af selvmordsforsøg.

Statens Institut for Folkesundhed konkluderer på baggrund af ovennævnte data og med ovennævnte forbehold følgende:

- Antallet af medicinforgiftninger blandt unge kvinder (15-24 år) har i perioden 2004-2013 ligget på mindst ca. 1500 årligt
- Antallet af medicinforgiftninger blandt unge kvinder (15-24 år) har været stigende fra 2004 til 2011, hvorefter det har været faldende
- Når udviklingen vurderes i forhold til antallet af danske kvinder i alderen 15-24 år fås et mere retvisende billede. Raten af medicinforgiftninger ser derfor ud til at være næsten uændret i perioden 2004-2013
- Det er forbundet med stor usikkerhed at vurdere omfanget af selvmordsforsøg, men udviklingen hos piger og kvinder i alderen 15-24 år må antages at svare til udviklingen i medicinforgiftninger, dvs. næsten uændret i perioden 2004-2013

På grund af ovennævnte usikkerheder omkring registrerede selvmordsforsøg og medicinforgiftninger i Danmark er det ikke muligt for Sundhedsstyrelsen at bekræfte en stigning i antallet af årlige selvmordsforsøg hos piger og kvinder i alderen 15-24 år. Dog fremgår det af den nationale sundhedsprofil for 2013, at 17,5 % af piger og kvinder i aldersgruppen 16-24 år har dårlig mental sundhed. Denne målgruppe har den højeste forekomst af dårlig mental sundhed i hele befolkningen, og der var tale om en stigning siden 2010.

Selvom sammenhængen mellem dårlig mental sundhed og selvmordsforsøg ikke er direkte, ved vi, at dårlig mental sundhed kan føre til udvikling af psykiske lidelser, som kan øge risikoen for selvmordsforsøg. Derfor er udviklingen bekymrende og det er relevant at have opmærksomhed på denne målgruppe".

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup / Sarah Bang Refberg