



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Sundhedsministeren

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 03-07-2017
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPENS
Sagsnr.: 1704271
Dok. nr.: 389270

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 13. juni 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 959 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 959:

"Ministeren bedes kommentere henvendelserne vedr. kroniske nervesmerter efter sterilisation, jf. SUU alm. del - bilag 234 og 347, herunder oplyse, hvordan der informeres om eventuelle gener og risici forud for beslutning om sterilisation."

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet nedenstående oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, som jeg kan henholde mig til:

"Det er velkendt, at der i en vis tid efter en mandlig sterilisation kan være ubehag og smerter hos de steriliserede. Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med større opgørelser over forekomst af smerter efter mandlig sterilisation. Sådanne opgørelser kan være svære at lave, primært fordi smerterne kan opstå lang tid efter sterilisationen, og der kan være flere mulige andre årsager. Dertil kommer, at smerter er svære at vurdere og kvantificere.

I den bedste reference, Sundhedsstyrelsen har kendskab til (Brit J Urol 2007, 100, 1330-1333), er forekomsten af smerter, der subjektivt påvirker livskvaliteten, afdækket blandt 450 mænd, der ikke havde smerter før sterilisation. I alt 4 mænd (0,9%), eller knapt 1 ud af 100 angav at have smerter godt et halvt år efter operationen og heraf – for 2 personer – smerter, hvor der kunne gå flere uger uden at de mærkede noget.

Der er således tale om ret små tal, hvor andre faktorer også kan spille ind. Der er en noget større gruppe af mænd (65 mænd, 14,7 %), der angiver at opleve mildere ubehag, men samtidig viser opgørelsen, at en del mænd, der havde smerter før operationen, blev smertefri. Det samlede billede er således lidt uklart, men det må være rimeligt at angive, at der kan opstå smerter også på længere sigt, men at det ikke er almindeligt.

Om risikoen er uacceptabelt høj afhænger bl.a. af en samlet vurdering af fordele og ulemper ved mandlig sterilisation. Det må i sidste ende være noget, som den enkelte mand skal vurdere på baggrund af grundig information fra den behandlende læge om

den forventede effekt, og de bivirkninger som man kan risikere at opleve, og med hvilken hyppighed de forekommer.”

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Emilie Norré Sørensen