

Sundhedsudvalget
Christiansborg

16. juli 2018

Vedrørende omskæring/afskæring af forhud på raske umyndige drengebørn

Der forefindes i omskæringsdebatten fra fortalernes side påstande om, at "det kun drejer sig om et lille stykke hud".

Der er derfor i nærværende henvendelse indsat et autentisk (amerikansk) billede¹ af en afskåren/omskåren forhud fra en nyfødt. Det fremgår, at den amputerede del næsten er på størrelse med det yderste led på en voksen tommelfinger. Forhuden er endda "dobbel" og indersiden sidder i de første leveår fast på penishovedet og bliver ved de fleste typer af omskæring afskåret indvendig med en skalpel eller flået af.

Estimeret indeholder netop denne del cirka 80 % af nerverne i penis. Det vil med andre ord sige, at den seksuelle følsomhed reduceres med 80 %.

Risiko for komplikationer - både akutte, post-operative, kortsigtede, langsigtede og livsvarige - er mange og mangeartede og oplystes her²:

Det skal præciseres, at en del af komplikationerne forekommer hos 100 % af de omskårne.

1. akut infektion i huden, knuderosen
2. akut post-streptokok glomerulonefrit
3. akut urintilbageholdelse
4. amputation af penis og glans
5. amputationsneurom
6. apnø og tilsyneladende livstruende begivenheder
7. autisme
8. bakteræmi
9. balanitis (infektion under forhuden)
10. bivalving (toskallethed)
11. blodforgiftning
12. blødning
13. blå mærker fra injiceret anæstesi
14. bronkopneumoni
15. byld på/ved penis og pungen

¹ Kilde: https://mobile.twitter.com/Intact_Nation/status/1012336865842638848

² Kilde: <http://circumcision.org/circumcision-over-100-known-complications-risks/>

16. børnesår
17. dannelse af arvæv som vedbliver at vokse
18. depression
19. differi
20. død
21. emotionel tilbagetrækning
22. ensidig bencyanose
23. epidermal cyste (cyste i yderste lag)
24. erektil dysfunktion
25. erysipelas (rosen, streptokok-infektion)
26. "falsk" forhudsfor snævring
27. fibrøst væv i penis - medfører krum/buet penis
28. flere betændte vævsforandringer
29. for tidlig sædafgang
30. forringet appetit
31. forringet forhold til forældre
32. forsnævring i urinvejsmunding
33. forstyrrelse af barnet / moderbåndet / usikker følelsesmæssig tilknytning
34. forøget gråd, grådabilitet
35. følelse af lemlæstelse / beskadigelse
36. føler sig forrådt af lægevidenskaben
37. hjerteproblemer
38. hudbroer
39. hudmærker
40. hyperaktivitet
41. hyperbilirubenæmi (gulsot)
42. hævelse og blærer fra lokalbedøvelse
43. hårstrangulering
44. infektion i hud / slimhinder hvor insekter lægger æg
45. irritabilitet
46. karudvidelser i lungernes blodårer - kan medføre blodpropper
47. knuder i underhuden
48. koldbrand i penis/pung
49. kompulsiv adfærd (OCD, tvangsneurose)
50. kronisk behov for glidecreme
51. kroniske nervesmerter i penis
52. latexallergi og overfølsomhed
53. lavt selvværd

54. lunge infektion
55. lymfe-ødem
56. lægeligt fremkaldt blæreekstrofi (misdannelse af urinveje og ydre kønsorganer)
57. lægeligt fremkaldt phimosis (forhud kan ikke længere trækkes tilbage og beskytte glans mv)
58. manglende evne til at identificere og udtrykke følelser
59. manglende evne til at trække (den resterende) forhud tilbage
60. mavesår
61. meningitis
62. mistillid
63. moderens nød og fortrydelse
64. nedkøling
65. nedsat kvindelig tilfredshed
66. nedsat penilfølsomhed
67. nedsat seksuel tilfredshed
68. nekrotisk fascitis (bakterieinfektion som ødelægger hud og underliggende væv)
69. nekrotisk gangræn/fascitiis (koldbrand grundet skade på væv, medfører ofte amputation)
70. nyresygdomme
71. opkastning
72. orgasme vanskeligheder
73. osteomyelitis (knogleinfektion forårsaget af pyogene mikroorganismer)
74. overdreven hudfjernelse
75. overdreven resterende hud
76. overtrædelse af retten til at være en intakt krop
77. paraphimosis (nedsat eller manglende blodforsyning til penishoved grundet strammende arvæv - kræver akut operation)
78. penis deformitet
79. post traumatisk stress syndrom
80. priapisme, langvarig erektion uden lystfølelse
81. punkteret lunge (formentlig af at skribe ifm operationen og efter)
82. ringen falder ikke af af sig selv efter den såkaldte Plastibell metode men gror ind i vævet
83. skader på hjertemuskel
84. skader på tarmsystem/fordøjelse
85. skam
86. skinnende deformiteter af glans
87. skjult ("begravet") penis
88. skoldet hud syndrom
89. smerte (med eller uden bedøvelse)
90. smertefuldt samleje

91. smerter ved urinering
92. sprængt blære
93. staffylokok infektion
94. stivkrampe
95. svulstlignende blodansamling
96. syfilis
97. tab af 25-50% af penishuden
98. tab af blodtilførsel til kønsorganerne ved hjælp af forkert bedøvelse
99. takykardi (hjerterytmeforstyrrelser)
100. testikel trauma
101. total blotlægning af penis (slet ingen tilbageværende hud på penis)
102. trauma
103. tuberkulose
104. tør og / eller keratiniseret glans
105. ubalance i røde blodlegemer, som kan medføre cyanose, hjerteproblemer og senere død
106. udtørring af glans
107. undgåelse af intimitet
108. urethral fistel
109. urethritis
110. urin fremad i subkutane fasciske planer
111. urinvejsinfektion
112. vaginal tørhed
113. venøs stasis
114. vrede
115. vævsdød, nedsat eller ophørt ilttilførsel til det skadede væv
116. ændret aktivitetsniveau
117. ændret moder-spædbarn interaktion
118. ændret søvn mønster
119. ændring af penis størrelse
120. ødem på/ved penis
121. øget onani
122. øget smerte respons

Ovenstående komplikationer forekommer overalt i Verden og uanset om omskæringen/amputationen er foretaget i eller udenfor hospitalsregi.

Fatalt nok rummer ingen diagnosesystemer mulighed for at tilknytte den enkelte komplikation til omskæringsamputationen, selvom komplikationen hidrører direkte fra omskæringen og ikke ville forefindes, såfremt omskæringen ikke havde været udført. Jeg har 13.6.2018 fremsendt en mail herom individuelt til alle

folkevalgte på Christiansborg. En henvendelse, som blandt andet indeholdt min mailkorrespondance med Sundhedsstyrelsen angående (manglende) registrering af komplikationer til omskæring, hvilket her ses i uddrag:

"Sundhedsdatastyrelsen har ikke data om komplikationer specifikt til rituel omskæring.

- *det der registreres i "SEI-indberetningen for rituelle omskæringer foretaget uden for sygehuse og klinikker", er blot om der er foretaget omskæring.*
- *Der er flere diagnosekoder, der vedrører komplikationer til kirurgiske indgreb. Disse registreres i Landspatientregisteret når en person kommer i kontakt med sygehus pga. komplikationen, komplikationen kunne være til rituel omskæring, men dette fremgår ikke specifikt. Det kunne også være komplikation til andre kirurgiske indgreb – under alle omstændigheder er der kun tale om umiddelbare kirurgiske komplikationer, dvs. komplikationer opstået max. 30 dage efter et indgreb."*

Jeg har af hensyn til den pågældende udeladt navn på afsender af ovenstående besvarelse hos Sundhedsstyrelsen.

Ergo: Der forekommer omfattende komplikationer til at blive omskåret men disse registreres ikke.

Derfor bør en beslutning om at blive omskåret uden medicinsk indikation først foretages udelukkende af personen selv, når vedkommende er minimum 18 år gammel og er informeret om de nævnte risici.

Det ville være ønskværdigt, hvis man også politisk traf beslutning om sine holdninger på et veloplyst grundlag.

Med venlig hilsen

Susanne Riis
Gierslevvej 1
4270 Høng

