



Bidrag til besvarelse af SUU alm. del – spm. 655 af 20. marts 2018

Spørger: Flemming Møller Mortensen (s)

Spørgsmål 655

Ministeren bedes redegøre for udviklingen de sidste fem år i antallet af danskere, der har kroniske smerter, herunder hvilke sygdomme eller tilstande der er skyld i disse smerter. Derudover bedes ministeren redegøre for, hvor mange af disse mennesker der er i behandling med morfinpræparater?

Bidrag til svar:

Sundhedsdatastyrelsen har ikke oplysninger i de nationale registre, der kan bidrage til at oplyse hvor mange personer, der lider af kroniske smerter i Danmark, herunder hvad der er skyld i smerterne. Sundhedsdatastyrelsen kan bidrage til den del af spørgsmålet om hvor mange personer, der er i behandling med morfinpræparater.

Sundhedsdatastyrelsen har afgrænset morfinpræparater som lægemidler af typen opioid, der bruges i smertebehandling (se afgrænsning nedenfor). På baggrund af Lægemiddelstatistikregisteret har Sundhedsdatastyrelsen opgjort antallet af unikke personer, der har haft mindst én receptindløsning på et opioid gennem de sidste 5 år, jf. tabel 1.

Tabel 1 Antal opioidbrugere i 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Kvinder	286.528	284.690	284.882	284.288	272.926
Mænd	198.284	197.652	199.011	201.507	194.415
TOTAL	484.812	482.342	483.893	485.795	467.341

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, Lægemiddelstatistikregisteret (opdateret til 28. februar 2018)

Note: Opioider omfatter ATC-gruppen N02A (opioider), R05DA04 (kodein) samt N07BC02 (methadon). Kodein-kombinationsprodukter, hvor den maksimalt ordinerede dosis af kodein er mindre end 10 mg morfin ækvivalent dagligt (N02AJ07, N02BA75)) er ekskluderet. Buprenorfin til brug i substitutionsbehandling (N07BC01, N07BC51) af opioidafhængighed er ligeledes ekskluderet.

I tabellen ses det, at antallet af personer i behandling med opioider var stabilt i perioden op til 2016, hvorefter antallet faldt i 2017. I 2017 havde omtrent 467.000 personer mindst én receptindløsning på et opioid.

Dataafgrænsning og kommentarer til metode

Undersøgelsens data er baseret på udtræk fra Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister (opdateret til 28. februar 2018). Lægemiddelstatistikregisteret er et register med detaljerede oplysninger om det samlede salg af lægemidler i Danmark, herunder medicin solgt på recept, håndkøbsmedicin og sygehusapotekssalg. Kun lægemidler købt på apotek via recept er personhenførbart og kan opgøres i antal personer. Øvrigt lægemiddelsalg vil ikke være personhenførbart, men stadig indgå i registeret og kan opgøres som totalsalg.

Til brug for SUU 655 er morfinpræparater afgrænset til opioider, der anvendes til behandling af stærke smerter. Dette inkluderer flere lægemidler af typen opioider, men er eksklusiv kombinationer af svage smertestillende med kodein, hvor den maksimalt ordinerede dosis af kodein er mindre end 10 mg morfin ækvivalent dagligt, da nogle findes i håndkøb, f.eks. Kodimagnyl.

Afgrænsning: ATC gruppe N02A (opioider) (ekskl. N02AJ07 og N02BA75 (kombinationer med kodein)), R05DA04 (kodein) samt N07BC02 (methadon).

Denne afgrænsning ekskluderer smertestillende lægemidler af typen non-steroid antiinflammatoriske midler (NSAID'er) (f.eks. ibuprofen og acetylsalicylsyre), paracetamol og kombinationer af disse med non-opioider, hvoraf nogle findes i håndkøb, samt atypiske smertestillende, som antiepileptika (f.eks. pregabalin og gabapentin) og antidepressiva (f.eks. amitriptylin og venlafaxin), der også kan anvendes til smertetilstande.

Da analyserne omhandler opioider til brug som smertestillende er buprenorphin til brug i substitutionsbehandling af opioidafhængighed (N07BC01, N07BC51) ekskluderet.

Antallet er opgjort på baggrund af mindst én receptindløsning på et af de ovennævnte opioider.