



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 24-05-2018
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPCGM
Sagsnr.: 1803554
Dok. nr.: 598938

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 26. april 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 885 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 885:

”Som opfølgning på samråd i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. april om dreng omskæring, jf. samrådssp. BK, bedes ministeren redegøre for, om der i dag er krav om, at drengbørn skal bedøves forud for en omskæring, herunder hvem der i givet fald er ansvarlig for at sikre den nødvendige bedøvelse og om der eksisterer godkendte præparater til dette formål, samt for kravene eller anbefalingerne til den efterfølgende smertedækning.”

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst følgende, som er koordineret med Lægemiddelstyrelsen:

”Det fremgår af vejledningen om omskæring af drenge, at lægen, der foretager omskæringen, skal sikre sig, at alle børn, også spædbørn, er smertedækket nødvendigt og tilstrækkeligt under indgrebet og i perioden efter operationen. Der skal ved valg af smertelindring tages hensyn til barnets alder, modenhedsgrad og øvrige medicinske forhold. Den smertelindring, der vælges, skal desuden være så god som mulig, med så lille risiko for bivirkninger og komplikationer som mulig.

Lægemiddelstyrelsen har for så vidt angår lægemidler til bedøvelse godkendt til formålet fremsendt følgende oversigt:

Lokal bedøvelse

Nerveblok

Omskæringer kan foretages i lokal bedøvelse, f.eks. nerveblok, som anlægges med to injektioner af et bedøvende lægemiddel. Nerveblokade er en anæstesi-form, hvor man fremkalder midlertidig blokering af nervesignalerne gennem en stor nervebane ved at sprøjte et lokalanæstesimiddel ind i nervens umiddelbare nærhed. Ofte lægges først en lokalbedøvelse. Denne metode kan bruges til alle aldre. Lokalbedøvelse med injektion er mere effektiv til at mindske smerten end brugen af hudbedøvende creme.

Godkendte lægemidler til børn omfatter

- Lidokain 1% og 2% til børn over 12 år
- Bupivacain 0,5 % til børn over 12 år til kirurgiske indgreb

- Bupivacain 0,5 % Akut smertelindring til børn over 1 år
- Ropivacain 0,5 % til nerveblokada børn fra 1 år

Godkendte lægemidler til nerveblok givet ved centrale nerver (rygmarvsbedøvelse) omfatter:

- Ropivacain 0,2% til spædbørn op til 12 år
- Lidokain 1% til børn fra 1 år

Fuld bedøvelse

Ved fuld bedøvelse sover barnet under indgrebet og er fuldt smertedækket. Fuld bedøvelse af spædbørn er en opgave for en erfaren speciallæge i anæstesiologi (narkose-læge) med særlig kompetence i bedøvelse af små børn. Styrelsen for Patientsikkerhed kan i den forbindelse tilføje, at fuld bedøvelse generelt ikke anbefales til børn under 6 måneder, med mindre dette er absolut nødvendigt.

Godkendte lægemidler til børn omfatter

- Sevofluran til børn fra fødslen
- Thiopental til børn fra fødslen
- Propofol til børn fra 1 måned

Smertedækning i de efterfølgende dage

Der kan anvendes paracetamol i børnedoseringer efter behov til børn i alle aldre, samt ibuprofen til børn over 6 mdr.”

Jeg kan henholde mig til Styrelsen for Patientsikkerheds og Lægemiddelstyrelsens svarbidrag.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Charlotte Magnéli