

Sundhedsudvalget 2008-09

SUU alm. del Svar på Spørgsmål 432

Offentligt

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Dato: 25. maj 2009

Sags nr.: 0903690

Sagsbeh.: SUMMSB / Retsstillings- og Internationalt kontor

Dok nr.: 33729

Besvarelse af spørgsmål nr. 432 (alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse den 2. april 2009. spørgsmålet er stillet efter ønske fra Sophie Hæstorp Andersen (S).

Spørgsmål 432:

"Ad svaret på spørgsmål 310

Kan ministeren bekræfte, at den anvendte rygeheroin i det hollandske heroinforsøg ikke blev ”båret i cigaretter af tobak”, således som det fremgår af svaret, men derimod blev administreret, uden tobak, via aluminiumsfolie og dermed på samme måde, som hovedparten af også danske rygere af illegal heroin administrerer stoffet? Kan ministeren yderligere bekræfte, at denne rygning af heroin foregik helt uden risici for sundhedspersonalet i det hollandske heroinforsøg?"

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, hvortil jeg kan henholde mig:

”Anvendelse af inhalerbar rygeheroin som lægemiddel i substitutionsbehandling er ikke anvendt i behandling andre steder end i den hollandske heroinbehandling.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende besvarelsen af SUU, alm. del. spm 310, erfare, at det er korrekt, at man i Holland specielt har fået udviklet og godkendt et inhalerbart diacetylmorfin produkt, som administreres via inhalation af dampe ved rygning i aluminiumsfolie. Der foreligger ikke data vedr. evt. carcinogen effekt eller andre helbredsmæssige skader af denne administrationsform. Sundhedsstyrelsen vurderer umiddelbart, at der vil være tale om risiko for betydelige skader i luftvejene, især hos denne målgruppe, som har en meget høj forekomst af kronisk obstruktive lungesygdomme. Sundhedsstyrelsen vil afvente resultaterne af de hollandske undersøgelser af respiratoriske bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen er bekendt med de omfattende sikkerhedsforanstaltninger (udsugning, adskilte overvågede rygekabiner) i de hollandske heroinklinikker, men er ikke bekendt med resultater af egentlige arbejdsmiljøvurderinger af denne behandlingsform.

Anvendelse af inhalerbar diacetylmorfin båret i tobak har været undersøgt, bl.a. i Schweiz for en del år siden, hvor man konstaterede en stor usikkerhed i forhold til mængder af absorberet diacetylmorfin ved denne administrationsform.”