

Bilag 2.

Fuglelivet ved Lading Sø 1990-2010

Af Henning Ettrup

Opgørelsen udarbejdet på baggrund af registreringer indtastet i DOFBASEN i perioden 1990-2010 samt egne iagttagelser. Der er i perioden registreret 150 forskellige arter, hvoraf nogle blot er set én enkelt eller nogle få gange, mens andre forekommer almindeligt og nogle gange i store antal. Kun fugle karakteristiske for søen og den næromgivelser omtales.

Karakteristiske arter

Lille Lappedykker

Yngler formentlig årligt med et par.

Toppet Lappedykker

Almindelig i søen, hvor den årligt yngler med 8-10 par.

Gråstrubet Lappedykker

Er truffet få gange med 1-2 individer. Yngler ikke i søen. Der foreligger ingen iagttagelser fra efter 2004.

Sortstrubet Lappedykker

Er truffet uregelmæssigt med op til 8 individer. Der foreligger ingen iagttagelser fra efter 2004.

Skarv

Ses almindeligt rastende ved søen med op til 20 (en enkelt gang dog 30) individer.

Rørdrum

Høres årligt ved søen, men den yngler formentlig ikke ved søen. En enkelt gang har jægere dog jaget 5 fugle (familieflok?) op.

Fiskehejre

Almindeligt forekommende ved søen året rundt med op til 10 individer, som fouragerer i søen.

Hvid Stork

Storken er registreret ved søen i 1996 og 1999, hvor ét eksemplar blev set.

Knopsvane

Almindeligt forekommende og træffes årligt i søen, hvor den ligeledes ofte forsøger at yngle. Det er dog sjældent at ynglen lykkes, formentlig fordi reden ødelægges. Der ses sjældent mere end 2-4 individer, da de er stærkt territoriehævdende. Der foreligger dog enkelte observationer af op til 20-30 fugle, og i 2010 op til 69 fugle.

Sort Svane

Enkelt observation af denne eksotiske art fra 2000.

Pibesvane

Enkelt observation af arten fra 2004, hvor 11 fugle rastede i søen i februar.

Bilag 2.

Sangsvane


Ses næsten årligt i vinterhalvåret med op til ca. 20 fugle, dog 61 fugle i februar 2001. I 1997 sås to fugle frem til sidst i april. Der foreligger inden oplysninger efter 2007.

Blisgås

Der foreligger to observationer af én fugl fra starten af året i henholdsvis 2001 og 2007.

Grågås

Grågåsen er gennem de senere år begyndt at optræde i større antal i efteråret. Gennem 1990-erne optræder den almindeligt og stabilt med op til 8-9 fugle. Den yngler første gang ved søen i 1998, og derefter er den truffet ynglende årligt med mindst et par. Efter årtusindeskiftet begyndte der at raste et stadig større antal gæs i søen, stigende fra ca. 20 fugle i 2001 til ca. 300 fugle i 2010.



Figur. Antal Grågås registreret ved de enkelte observationer i perioden 1990-2010.

Canadagås

Denne introducerede art er truffet 3 gange ved søen med 1-3 eksemplarer i perioden 2001-2004.

Mørkbuget Knortegås

Truffet enkelt gang i november 2001, hvor én fugl rastede i søen.

Gravand

Arten træffes almindeligt i søen med op til 15 individer. Den yngler om ikke årligt, så dog ofte i skoven ved søen, hvorfra den fører sine ællinger til søen.

Pibeand

Træffes jævnlgt ved søen, men i meget varierende antal. Nogle år slet ikke eller kun ganske få, andre år er noteret op til godt 60 fugle.

Bilag 2.

Knarand

Er noteret 3 gange i perioden (2002, 2005 og 2010) med 1-2 fugle.

Krikand

Blev set almindeligt i træktiden og i vinterperioden frem til 2006. Den blev set i meget varierende antal, fra ét enkelt individ til 120 fugle. Efter 2004 ses den dog kun fåtalligt og uregelmæssigt, og den er ikke noteret siden 2006.

Gråand

Gråanden optræder talrigt i søen, bl.a. fordi den udsættes med henblik på jagt. Søen rummer en fast lille ynglebestand på 5-10 par. I det tidlige forår og igen sidst på året tællet op til 300 fugle, men enkelte gange er truffet flere, således 770 i 2003 og 500 i 2005.

Atlingand


Ét par er truffet 2 gange, i henholdsvis 2000 og 2002.

Skeand

Er truffet nogle få gange ved søen, således i 1999 med 5 individer, 2002 med 2 fugle og i 2003 ét enkelt eksemplar.

Taffeland

Forekommer almindeligt i træktiden og vinterperioden, i størst antal dog omkring årtusindeskiftet. Her kunne tælles op 650 fugle i november måned, men siden 2001 er antallet igen faldet, så der nu sjældent ses mere end 100 fugle. Den optræder uregelmæssigt med et enkelt ynglepar i søen.




Figur. Antal Taffeland registreret ved de enkelte observationer i perioden 1990-2010. Som det fremgår af figuren var antallet højest i perioden omkring årtusindeskiftet.

Bilag 2.

Troldand

Er som Taffeland almindeligt forekommende i søen, om end i lavere antal – sjældent over 100 fugle, men er dog set i et antal på op til ca. 140 fugle. Som det ses af figuren, gik arten frem fra sidst i 90-erne med kulmination i 2006. Har muligvis ynglet i søen én enkelt gang i perioden.



Figur. Antal Troldand registreret ved de enkelte observationer i perioden 1990-2010.

Bjergand

Truffet tilfældigt i 2004 og 2006 med henholdsvis 2 og 3 fugle.

Sortand

Denne havgående dykand har en enkelt gang forvildet sig ind i søen i den 24/5 1994.

Hvinand

Denne dykand træffes almindeligt i mindre antal årligt i søen i træk- og vinterperioden. Normalt ses højst op til 20 fugle, men enkelte gange er set på til godt 50 fugle.

Lille Skallesluger

Arten er truffet næsten årligt i søen i vinterperioden siden 1998 med op til 5 individer.

Stor Skallesluger

Arten yngler i Danmark ved skovklædte kyster, men optræder om vinteren i vore søer. Ved Lading sø optræder den i vinterperioden årligt med op til omkring 25 fugle.

Rørhøg

Arten optræder årligt ved søen, hvor den yngler fast med ét par.

Bilag 2.

Vandrikse

Yngler givet ved søen måske blot med et enkelt ynglepar, idet den årligt høres syngende (grisehyl) fugle.

Engsnarre


Arten blev hørt nogle få gange i maj 1999. Derefter blev den igen truffet i sommeren 2006, hvor den kan have ynglet ved søen.

Grønbenet Rørhøne

Træffes fåtalligt og yngler formentlig med enkelt til to par årligt i søen.

Blishøne

Arten optræder almindeligt og i stigende antal i søen. Den har en fast ynglebestand på op til 10-11 par. Før årtusindeskiftet kunne udenfor yngletiden tælles op til 20-30 fugle. Antallet nåede 100 rastende fugle i 1999 og er især sidst i perioden øget i antal og har i 2010 passeret 500 fugle.



Figur. Antal Blishøne registreret ved de enkelte observationer i perioden 1990-2010.


Strandskade

Strandskaden forekommer normalt ved kysterne, men tidligere ynglede den også inde i landet i bl.a. roemarker. Måske var det en reminiscens fra dengang, at den ynglede på engen i østenden af søen med ét enkelt par frem til 2005. Herefter er den ikke noteret ved søen, måske fordi man begyndte at have hundetræning på engen hvor Strandskaden ynglede.

Bilag 2.

Vibe

Arten optræder almindeligt ved søen, hvor den også yngler med nogle få par. Den træffes udenfor yngletiden i et meget varierende antal med maksimum på omkring 400 fugle. Enkelt gang i 1995 er talt 675 fugle. Det ser ud som om det rastende antal gennem de senere år har været aftagende.



Figur. Antal Vibe registreret ved de enkelte observationer i perioden 1990-2010.

Dobbeltbekkasin

Forekommer årligt fåtalligt med op til højest 10 fugle ved søen, hvor den også yngler med enkelt eller få par. Enkelte gange er set flere fugle, og maksimum er 121 fugle i oktober 2004.

Mudderklire

Lille vadefugl, som forekommer sporadisk i sommerperioden og det tidlige efterår. Den er noteret næsten årligt i et antal på op til 9 individer.

Dværgmåge

En art som optræder sjældent på gennemtræk i slutningen af august måned. Den er således noteret 3 gange i henholdsvis 2000, 2002 og 2006.

Hættemåge

Hættemågen benytter almindeligt i søen som rasteområde, men yngler ikke i søen, selv om der til tider er tilløb hertil. Den kan tælles i store tal i det sene forår og igen i efteråret, således op til 2000 fugle i april og 500 i august/september.

Bilag 2.

Stormmåge

Almindeligt forekommende i søen, men kan optræde i endnu større antal end Hættemågen. Der er således talt op til 6000 rastende fugle i april måned 2004 og maksimalt 4000 i november 2004. Den yngler ikke i området.

Sildemåge

Arten er tilsyneladende under spredning i indlandet, og er også siden 2005 registreret rastende i antal på op til 4 fugle i søen.

Sølvmåge

Arten træffes almindeligt rastende i søen med op til omkring 50 fugle. To gange er der dog registreret henholdsvis 600 rastende i november 1994 og 500 fugle i september 1995.

Svartbag

Arten træffes jævnligt fåtalligt i søen med 1-2 fugle. Undtagelsesvist kan tælles op til 10 fugle.

Fjordterne

Arten træffes tilfældigt og uregelmæssigt ved søen i sensommeren med 1-3 fugle, dog enkelt iagttagelse af 11 fugle i august 2003. Der foreligger blot enkelt iagttagelse af 2 fugle fra maj 2005, hvorefter der ikke er rapporteret ternere.

Gøg

Gøgen optræder årligt med 1-2, sjældent 3, kukkende fugle i rørskoven omkring søen.

Svaler

Landsvale og Bysvale ses ofte at fouragere over søen, ligesom store antal både i det sene forår og der tidlige efterår benytter rørskoven til overnatning. Der kan således tælles i tusinder af svaler til overnatning, flest 10.000 fugle i august 2002 og 3000 fugle i september 1999.

Nattergal

Nattergalen yngler årligt med 1-2 par ved søen.


Græshoppesanger

Arten høres næsten årligt med 1 syngende. Enkelte år formodes der at være et par ynglepar, idet der høres 2-3 syngende.

Bilag 2.

Stær

Ses almindeligt ved søen i større eller store antal i forbindelse med, at de går til fælles overnatning på samme måde som svalerne. Den kan i det tidlige efterår ses i store antal danne "sort sol" i forbindelse med, at den går til overnatning i søens rørskov. På stille solrige aftener i august – september måned kan den tælles op til 10.000 fugle, dog kulminerende med ca. 25.000 fugle i oktober 2003.



Figur. Antal Stær registreret ved de enkelte observationer i perioden 1990-2010.

Øvrige udvalgte arter:

Rovfugle

Flere forskellige arter ses ved søen både almindeligt og tilfældigt, enten fordi de yngler i nærheden: Rød Glente, Musvåge, Tårnfalk, Spurvehøg, Duehøg og Hvepsevåge yngler i de omliggende skove og hegn; eller fordi de passerer i trækperioden: Fiskeørn, Fjeldvåge, Blå Kærhøg, Dværgfalk og Vandrefalk (enkelt gang i 2005). I 2010 blev også noteret Havørn - hvilket jo måtte ske men den fremgang arten oplever.

Vagtel

Arten, der hører til de mere varmekrævende er hørt syngende uregelmæssigt med ét enkelt eksemplar næsten årligt siden årtusindeskiftet.

Plettet Rørvagtel

Arten er hørt syngende i 2000 og 2006

Bilag 2.

Vadefugle

Forskellige vadefuglearter – foruden de 4 nævnte arter – træffes tilfældigt og uregelmæssigt ved søen. Det gælder Lille og Stor Præstekrave, Hjejle, Brushane, Enkeltbekkasin, Tredækker, Småspove, Storspove, Rødben, Hvidklire, Svaleklire og Tinksmed.

Øvrige arter

De almindelige rørskovsfugle, som Sivsanger, Rørsanger, Kærsanger og Rørspurv forekommer almindeligt ved søen, men også de mere ualmindelige, som f.eks Savisanger (juni 2006) og Skægmejse (årligt fra 1999-2005) kan træffes.