

**Sundhedsudvalget 2010-11
SUU alm. del , endeligt svar på spørgsmål 448
Offentligt**



Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M im@im.dk
W www.im.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 14. marts 2011
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMJMY
Sags nr.: 1102312
Dok nr.: 452993

Folketingets Sundhedsudvalg har den 17. februar 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 448 (Alm. del) til indenrigs- og sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S).

Spørgsmål nr. 448:

"Ministeren bedes redegøre for, hvilke henvisningsretningslinjer for fedmekirurgi, der anvendes i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien og Holland."

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Sundhedsstyrelsen om bidrag.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at de har kontaktet de pågældende landes sundhedsstyrelser.

Styrelsen afventer stadig svar fra disse, og vender tilbage med svar til ministriet, når styrelsen har modtaget svar.

Sundhedsstyrelsen kan for nuværende oplyse, at kriterierne for Storbritannien er som følger: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) anbefaler følgende henvisningsretningslinjer som her gengives på originalsproget (<http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/11000/30365/30365.pdf>):

"Bariatric surgery is recommended as a treatment option for adults with obesity if all of the following criteria are fulfilled:

- *they have a BMI of 40 kg/m² or more, or between 35 kg/m² and 40 kg/m² and other significant disease (for example, type 2 diabetes or high blood pressure) that could be improved if they lost weight*
- *all appropriate non-surgical measures have been tried but have failed to achieve or maintain adequate, clinically beneficial weight loss for at least 6 months*
- *the person has been receiving or will receive intensive management in a specialist obesity service*
- *the person is generally fit for anaesthesia and surgery*
- *the person commits to the need for long-term follow-up.*
- *Bariatric surgery is also recommended as a first-line option (instead of lifestyle interventions or drug treatment) for adults with a BMI of more than 50 kg/m² in whom surgical intervention is considered appropriate.""*

Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsen bidrag.

Med venlig hilsen

Bertel Haarder / Jesper Myrup