



30. jan. 2017

Sundhedsanalyse, Lægemiddelstatistik
og Sundhedsdataprogrammet
STBK

Sag: 17/01406

Bidrag til besvarelse af SUU alm. del – spm. 353 af 16. januar 2017

Spørgsmål 353

Ministeren bedes opgøre udviklingen i antallet af henholdsvis børn og voksne med nervøse/stressrelaterede tilstande. Opgørelsen bedes gå så mange år tilbage som muligt og frem til og med 2016.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S).

På baggrund af Landspatientregisteret (LPR) er der opgjort antallet af unikke hhv. børn og voksne med nervøse og stressrelaterede tilstande i perioden 1995-2015. I besvarelsen indgår en opgørelse over antallet af nydiagnostiserede borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande (incidens) samt antallet af unikke borgere, der i et givet år har modtaget behandling. En borger tælles som nydiagnostiserede (incident) i det år, borgeren første gang optræder i LPR med en diagnose for en nervøs eller stressrelateret tilstand.

Da LPR kun omfatter borgere med kontakt til sygehusvæsenet, indgår formentligt primært mere alvorlige tilfælde af nervøse og stressrelaterede tilstande i opgørelsen. Tilfælde, hvor borgerne udelukkende har kontakt med praksissektoren, indgår ikke i opgørelsen, idet de nationale sundhedsregistre ikke indeholder registreringer af diagnoser i praksissektoren.

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave en retvisende opgørelse for 2016. Seneste år i opgørelsen er derfor 2015. Psykiatriske patienter er først registreret i LPR fra 1995. I opgørelsen af nydiagnosticerede vil borgere, der har haft diagnosen før 1995, først optræde i opgørelsen ved efterfølgende kontakt efter 1995.

Afgrænsningen af ”nervøse og stressrelaterede tilstande” er defineret ved ICD-10 diagnosekoderne DF4* Nervøse og stress-relaterede tilstande samt tilstande med psykisk betingede legemlige symptomer [DF40-DF48]¹ minus DF45* (Somatoforme tilstande). Der er ikke medtaget diagnoser, der udelukkende er stillet på skadestue eller ved akut ambulans kontakt. For diagnoser stillet på psykiatriske afdelinger er der både medtaget aktions- og bidiagnoser, mens der for diagnoser stillet på somatiske afdelinger kun er medtaget aktionsdiagnoser.

Tabel 1 viser at antallet af nydiagnosticerede borgere med nervøse og stressrelaterede tilstande generelt har været stigende over perioden fra 1995 til 2015.

¹ DF40 Fobiske angsttilstande, DF41 Andre angsttilstande, DF42 Obsessiv-kompulsiv tilstand, DF43 Reaktionen på svær belastning og tilpasningsreaktioner, DF44 Dissociative tilstande og forstyrrelser og DF48 Andre nervøse tilstande

Tabel 1: Antal unikke nydiagnosticerede borgere i sygehusvæsenet med nervøse og stressrelaterede tilstande (incidens), 1995-2015

	Børn og unge (under 19 år)	Voksne (19 år og derover)	I alt
1995	912	7.947	8.859
1996	816	7.322	8.138
1997	880	7.127	8.007
1998	943	7.097	8.040
1999	1.080	7.447	8.527
2000	1.195	7.134	8.329
2001	1.324	7.416	8.740
2002	1.398	7.945	9.343
2003	1.588	8.534	10.122
2004	1.919	8.832	10.751
2005	2.043	8.800	10.843
2006	2.027	9.288	11.315
2007	2.158	9.266	11.424
2008	2.721	9.837	12.558
2009	2.784	10.020	12.804
2010	2.780	10.419	13.199
2011	3.175	12.019	15.194
2012	3.606	13.211	16.817
2013	4.009	13.775	17.784
2014	4.690	15.229	19.919
2015	4.724	15.384	20.108

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. januar 2017, Sundhedsdatastyrelsen.

Anm: Afgrænsningen af "nervøse og stressrelaterede tilstande" er defineret ved ICD-10 diagnosekoderne DF40 Fobiske angsttilstande, DF41 Andre angsttilstande, DF42 Obsessiv-kompulsiv tilstand, DF43 Reaktioner på svær belastning og tilpasningsreaktioner, DF44 Dissociative tilstande og forstyrrelser og DF48 Andre nervøse tilstande. Der ikke medtaget diagnoser stillet på skadestue eller ved akut ambulant kontakt. For diagnoser stillet på psykiatriske afdelinger er der både medtaget aktions- og bidiagnoser, mens der for diagnoser stillet på somatiske afdelinger kun er medtaget aktionsdiagnoser.

Tabel 2 viser at antallet af borgere, der modtaget behandling for nervøse og stressrelaterede tilstande generelt har været stigende i periode 1995 til 2015.

Table 2: Antal unikke borgere, der har modtaget behandling i sygehusvæsenet for diagnosen nervøse og stressrelaterede tilstande, 1995-2015

	Børn og unge (under 19 år)	Voksne (19 år og derover)	I alt
1995	800	7.965	8.765
1996	870	8.167	9.037
1997	956	8.734	9.690
1998	1.046	9.397	10.443
1999	1.215	9.978	11.193
2000	1.321	9.966	11.287
2001	1.497	10.727	12.224
2002	1.617	10.788	12.405
2003	1.822	11.968	13.790
2004	2.159	12.578	14.737
2005	2.337	12.515	14.852
2006	2.510	13.102	15.612
2007	2.608	13.699	16.307
2008	3.591	16.189	19.780
2009	3.170	15.448	18.618
2010	3.485	16.261	19.746
2011	4.044	18.684	22.728
2012	4.497	20.373	24.870
2013	5.276	21.939	27.215
2014	6.188	24.574	30.762
2015	7.390	28.699	36.089

Kilde: Landspatientregisteret pr. 10. januar 2017, Sundhedsdatastyrelsen.

Anm: Afgrænsningen af "nervøse og stressrelaterede tilstande" er defineret ved ICD-10 diagnosekoderne DF40 Fobiske angsttilstande, DF41 Andre angsttilstande, DF42 Obsessiv-kompulsiv tilstand, DF43 Reaktioner på svær belastning og tilpasningsreaktioner, DF44 Dissociative tilstande og forstyrrelser og DF48 Andre nervøse tilstande. Der ikke medtaget diagnoser stillet på skadestue eller ved akut ambulans kontakt. For diagnoser stillet på psykiatriske afdelinger er der både medtaget aktions- og biddiagnoser, mens der for diagnoser stillet på somatiske afdelinger kun er medtaget aktionsdiagnoser.