



Sundhedsministeren

Sundheds- og Ældreudvalget

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 15-08-2018
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: DEPACC
Sagsnr.: 1804440
Dok. nr.: 666097

Sundheds- og Ældreudvalget stillede den 30. maj 2018 spørgsmål nr. 1053 (Alm. del) vedrørende de svenske og norske erfaringer med forebyggelse af re-smitte af hepatitis C.

Sundhedsministeren besvarede udvalgets spørgsmål den 27. juni 2018 på baggrund af bidrag fra Sundhedsstyrelsen, jf. vedhæftede. Styrelsen havde på tidspunktet for besvarelsen dog endnu ikke modtaget svar fra Norges Folkehelseinstituttet vedr. spørgsmålet om, hvorvidt der findes dokumenterede, norske erfaringer med behandling og re-smitte blandt stofbrugere.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende oplyst Sundheds- og Ældreministeriet om, at Folkehelseinstituttet har svaret følgende:

"I Norge er man aktuelt i gang med at revidere Den nasjonale hepatittstrategien fra 2016, primært som følge af ændringer i behandlingstilbuddet. Folkehelseinstituttet oplyser, at en markant prisreduktion har spillet ind i beslutningen om, at alle med kronisk hepatitis C i Norge fremover kan få tilbudt behandling, uafhængigt af hvilken type og hvilken grad af leverpåvirkning, der er tale om (tidligere har behandlingstilbuddet været knyttet til graden af leverforandringer).

I løbet af de seneste år er betydelig flere patienter med hepatitis C blevet behandlet i Norge, også personer som er aktive stofbrugere, herunder injektionsbrug, men der foreligger endnu ingen erfaring med behandling i så stort et omfang, som forventes fremover. Det forventes, at der med det udvidede behandlingstilbud fremover vil blive behandlet endnu flere aktive stofbrugere. Dette medfører på den ene side, at der vil blive behandlet flere personer i risiko for re-smitte, men på den anden side også, at smittetrykket nedsættes, da færre vil være kronisk inficeret. På denne baggrund arbejder Folkehelseinstituttet på at iværksætte en forstærket overvågning af hepatitis C.

Folkehelseinstituttet henviser endvidere til forskningsresultater, blandt andet fra Norge, som tyder på at man kan forvente at ca. 5 % af dem, som efter behandling fortsætter stofindtag, bliver gensmittet om året. Det vil dog afhænge af det samlede smittetryk samt af de generelle tiltag mod smitte, såsom sprøjtehygiejne (undlade deling) og overgang til methadonbehandling m.m."

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby