



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 15-05-2018
Enhed: AELSAM
Sagsbeh.: DEPRSC
Sagsnr.: 1801438
Dok. nr.: 585972

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 2. februar 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 518 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Flemming Møller Mortensen (S).

Spørgsmål nr. 518:

”Ministeren bedes få Sundhedsstyrelsen til at vurdere, hvor mange fremtidige kræfttilfælde det kan forventes for dem, der i dag er i aldersgruppen 0-17 år, hvis de overtager det rygemønster, som resten af befolkningen har, og hvor stor en reduktion i antallet af fremtidige kræfttilfælde, det vil kunne forventes for samme aldersgruppe, hvis ingen af dem nogensinde begynder at ryge.”

Svar:

Mit ministerium har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Rygning er den enkelte faktor, der er skyld i flest kræfttilfælde årligt. Hver tredje dansker får en kræftsygdom. I 2014 blev der i alt registreret 39.000 nye kræfttilfælde i den danske befolkning. Rygningens bidrag til udvikling af kræft er forskellig fra sygdom til sygdom, men samlet set estimeres det, at 19,4 pct. af alle kræfttilfælde skyldes rygning. Det betyder, at ca. 7.500 af de 39.000 kræfttilfælde i 2014 kan tilskrives rygning. *Estimeret antal fremtidige kræfttilfælde ved uændret rygemønster*

Såfremt de 0-17 årige overtager samme rygemønster, som resten af befolkningen har i dag, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at deres risiko for at udvikle kræft også vil blive den samme, som ses i resten af befolkningen i dag. Det samlede antal kræfttilfælde for gruppen vurderes derfor at følge samme mønster som beskrevet ovenfor, såfremt anden risikoadfærd forbliver uændret.

Estimeret antal fremtidige kræfttilfælde hvis ingen 0 -17 årige ryger

- Hvis ingen af de 0-17 årige begynder at ryge, vurderer Sundhedsstyrelsen, at ingen af dem vil udvikle rygerelateret kræft. Det vurderes at resultere i, at de vil opleve knap 20 pct. færre tilfælde af kræft i løbet af deres liv, end de ville have oplevet, hvis de udviklede samme rygemønster som resten af befolkningen. Det estimeres, at svare til at ca. 75.000 personer ikke vil opleve at få en kræftdiagnose. Det er baseret på, at: der er ca. 1.165.500 personer i alderen 0 – 17 år i 1. kvartal 2018
- hver 3. dansker får kræft
- 19,4 pct. af alle kræfttilfælde skyldes rygning.

Der er ikke taget højde for andre faktorer, som kan have indflydelse på antallet af personer, der får en kræftsygdom, som fx, at nogle oplever at få mere end én kræftdiagnose.”

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby / Rikke Skaarup Schjødt