



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 08-10-2020
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPAJU
Sagsnr.: 2013216
Dok. nr.: 1408336

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. september 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 1812 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Pihl Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 1812:

”Finder ministeren, at læger i alle tilfælde hvor lungekræft er en teoretisk om end sjældnen differentialdiagnose altid skal henvise til lungepakke, selv om andre diagnoser, som den praktiserende læge selv kunne behandle efter billeddiagnostik, er mere sandsynlige?”

Svar:

Mit ministerium har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

. / . ”Sundhedsstyrelsen henviser indledningsvist til besvarelsen af SUU alm. del. 1504.

I forhold til den gruppe af patienter, hvor man ønsker at be- eller afkræfte mistanke om lungekræft, har Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) på baggrund af den eksisterende litteratur og praktisk erfaring konkluderet, at den mest præcise billeddiagnostik for påvisning og udelukkelse af lungekræft er fulddosis CT-skanning med kontrast af brystkasse og øvre del af maveregion.

Ved alarmsymptomer, der giver mistanke om lungekræft, og hvor sigtet med den billeddiagnostiske udredning er at be- eller afkræfte mistanke om lungekræft med sikkerhed, er den faglige standard således primær udredning med CT med kontrast af brystkasse og øvre del af maveregionen som beskrevet i pakkeforløb for lungekræft.

Ved uspecifikke symptomer, der giver mistanke om alvorlig sygdom, som kan være kræft, og hvor sigtet er at be- eller afkræfte alvorlig sygdom, herunder lungekræft, er den aktuelle faglige standard for den primære billeddiagnostiske udredning enten CT med kontrast af brystkasse, mave- og bækkenregion, eller røntgen af brystkasse og ultralydsundersøgelse af maveregion som beskrevet i styrelsens diagnostiske pakkeforløb, der aktuelt er under revision.

I forhold til uspecifikke symptomer, hvor der ikke er konkret mistanke om alvorlig sygdom, men hvor der er mistanke om flere forskellige diagnoser, og hvor sigtet med udredningen er en bred undersøgelse, vil der typisk vælges billeddiagnostisk undersøgelse ud fra en konkret vurdering og visitation.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Annemette Juul