



INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Folketingets Sundhedsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 455 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 11. april 2025. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DD).

Spørgsmål nr. 455:

"Kan sundhedsministeren oplyse, hvor mange danskere, der hvert år får kræft, henholdsvis dør af kræft, og hvilke faktorer der hvert år er skyld i de konstaterede tilfælde henholdsvis dødsfaldene?"

Svar:

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg vil henholde mig til:

"Sundhedsstyrelsen har indhentet svarbidrag fra Statens Institut for Folkesundhed, der svarer:

"I 2018 døde 15.696 danskere af kræft og 44.274 udviklede kræft.

Af disse tilfælde kan det estimeres, at i alt 14.235 tilfælde (32,2%) var forårsaget af en eller flere af de risikofaktorer, der er nævnt i tabel 5¹.

De hyppigste risikofaktorer var rygning (14,6%), UV-stråling (5,8%), overvægt (3,3%), infektioner (2,9%), ioniserende stråling (2,7%) og alkohol (2,6%).

Der findes ikke en lignende analyse af kræftdødsfald, men det er sandsynligt, at andelen af kræftdødsfald, der er forårsaget af de nævnte risikofaktorer, vil være relativt højere sammenlignet med det samlede antal kræfttilfælde.

I den undersøgelse, der er refereret ovenfor, har man set på de væsentligste kræftfremkaldende faktorer – de såkaldte klasse 1 karcinogener. Udover disse risikofaktorer er der andre påvirkninger, der klassificeres som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker (gruppe 2A) og en række andre faktorer med mindre sandsynlig sammenhæng med kræftudvikling. Der foreligger ikke konkrete tal for disse faktors andel af kræftudviklingen.

Udover, at der er andre risikofaktorer end de, der er estimerede, vil der være en vis usikkerhed på sådanne beregninger, ligesom tallene ikke direkte kan overføres til en individuel risiko for den enkelte. Det skyldes, at en række individuelle faktorer som alder, køn, socioøkonomiske faktorer og ikke mindst arvelige faktorer har betydning for den enkeltes risiko for udvikling af kræft.

¹ Tybjerg, A.J., et al., Updated fraction of cancer attributable to lifestyle and environmental factors in Denmark in 2018. Sci Rep, 2022. 12(1): p. 549

Der er ikke fagligt belæg for at antage, at de beskrevne sammenhænge har ændret sig siden 2018.

Tabel 1: Forekomsten af kræfttilfælde fordelt på risikofaktorer. Procent og antal. 2018

Risikofaktor	Samlet antal kræfttilfælde 2018 44.274	
	% af total	Antal
Rygning	14,6%	6.478
Overvægt	3,3%	1.452
Infektioner	2,9%	1.296
UV- stråling	5,8%	2.550
Alkohol	2,6%	1.139
Ioniserende stråling	2,7%	1.188
Luftforurening	1,1%	491
Kost	1,3%	594
Manglende fysisk aktivitet	0,3%	122
Hormonbehandling efter menopausen	0,8%	364
P-piller	0,2%	82
I alt	32,2%	14.235

”

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at det ikke har været muligt at foretage nye opgørelser eller en litteraturofdækning inden for tidsfristen. Sundhedsstyrelsen er ikke bekendt med nyere danske undersøgelser end den kilde, som anvendes i besvarelsen fra Statens Institut for Folkesundhed.”

Med venlig hilsen

Sophie Løhde